

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Persebaran tumbuhan lengkir (*Tacca leontopetaloides* (L.) Kuntze) di Pulau Bangka ditemukan disemua Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang. Jumlah individu terbanyak ditemukan di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 678 individu dan yang paling sedikit di Kota Pangkalpinang yaitu 16 individu. Lengkir disetiap lokasi ditemukan dengan dominan pola persebaran berkelompok.
2. Karakteristik morfologi lengkir disemua lokasi adalah sama, hal ini disebabkan jenis lengkir yang ditemukan adalah satu jenis yaitu *Tacca leontopetaloides* (L.) Kuntze.
3. Pembuatan tepung dari umbi lengkir dapat dilakukan dengan cara mencuci bersih umbi yang telah dikupas, umbi diparut kemudian hasil parutan diremas-remas dan disaring, hasil saringan ditampung dalam wadah kemudian airnya diendapkan dan air sisa endapan dibuang dan dicuci lagi untuk mengurangi rasa pahit, hasil endapan diambil dan dijemur hingga kering dan menjadi tepung lengkir.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan, diperlukan:

1. Penelitian lanjutan terhadap uji fitokimia tumbuhan lengkir guna memperdalam potensinya sebagai tumbuhan obat.
2. Penelitian terhadap budidaya tumbuhan lengkir perlu dilakukan guna menunjang bahan baku sebagai sumber pangan alternatif.